

창원보건소 **감염병** 소식지

창원시창원보건소(055-225-5741)

건강한 우리가족, 백일해 예방하기!!

✓ **백일해란?** 백일해균 감염에 의한 급성 호흡기 질환

잠복기	▶ 4~21일(평균 7~10일)
감염경로	▶ 호흡기 분비물이나 비말을 통한 호흡기 전파
환자관리	▶ 항생제 치료 시작 후 5일까지 등원 및 등교 중지
	▶ 잠복기(7~10일)→아급성기(1~2주)→급성기(4주이상)→회복기(1~2주)
주요증상	   
	콧물 눈물 경한 기침 발작적 기침

백일해, 예방접종이 가장 효과적인 예방법입니다!

- ▶ 소아 예방접종 : 모든 영유아를 대상으로 국가무료 예방접종 실시 중
- ▶ 성인 예방접종 : 매 10년 마다 1회 접종 필요

구분		접종시기	최소 접종연령	최소 접종간격	백신
기초 접종	1차	생후 2개월	생후 6주	4주	DTaP
	2차	생후 4개월	생후 10주	4주	DTaP
	3차	생후 6개월	생후 14주	6개월	DTaP
추가 접종	4차	생후 15~18개월	생후 12개월	6개월	DTaP
	5차	만 4세~만 6세	만 4세	-	DTaP
	6차	만 11세~만 12세	만 11세	-	Tdap

백일해, 이런 것들이 궁금해요!

✓ 의심증상은 어떤 것들이 있나요?

- ▶ 기침이 2주 이상 지속되며 다음 중* 하나 이상 동반되는 증상이 있거나 환자와 접촉한 후 기침이 2주 이상 지속될 때는 백일해를 의심하고 진료 바랍니다.

* 발작성 기침, 기침 후 구토

✓ 거주하는 지역에 백일해가 유행할 경우 임신부는 Tdap접종을 받아야 되나요?

- ▶ 임신은 Tdap 접종의 금기사항은 아니나, 평상시 가임기 여성의 경우 가능하면 임신 전에 Tdap을 접종하고, 임신 중이라면 출산 직후에 접종하도록 권장합니다. 다만, 거주 지역에 백일해가 유행할 경우 임신 27~36주에 Tdap 접종을 권장합니다.

✓ 백일해 확진된 학생이 항생제를 정해진 기간 동안 복용했는데도 기침이 나는 경우, 등교가 가능한가요?

- ▶ 항생제별 복용기간은 다르지만, 백일해에 유효한 항생제 복용 시 격리(등교 중지) 기간은 항생제 복용 후 5일입니다. 다만 증상에 대한 별도의 치료가 필요할 수 있으니 의료기관 상담 후 등교여부를 결정하도록 안내하는 것이 좋습니다.

✓ 만약 의사환자가 검사결과는 음성으로 나왔지만, 기침이 계속될 경우 등교가 가능한가요?

- ▶ 백일해 검사결과는 음성이라도 다른 감염병에 의한 증상(기침, 열)이 의심되기 때문에 호전될 때까지 등교 중지를 권고하는 것이 좋습니다.

✓ 백일해가 집단 발생한 학교의 교직원도 예방접종 미접종자일 경우 접종을 해야 하나요?

- ▶ 백일해 예방을 위해 교직원도 Tdap 접종력이 없는 경우 예방접종이 권장됩니다.

✓ 가족 중 백일해 환자가 있다면 어떻게 해야 할까요?

- ▶ 연령이나 예방접종력에 관계없이 예방적 항생제 복용바랍니다.
 - 유효 투여 시기 : 감염원의 기침 시작 후 3주 내 투여 시작
- ▶ 총 4회 접종을 받지 않았거나 최근 3년 이내에 접종을 받지 않은 7세 미만 아동은 환자와 접촉 후 가능하면 빨리 접종하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 접촉자는 예방적 항생제 복용 기간 중 초기 5일간 투여가 끝날 때까지는 대중 집합장소 외출을 자제하는 것이 좋습니다.